

Presentación del medicamento (espesolimab):



1 caja con **2 viales** que contienen **450mg de espesolimab** cada uno. Cada vial contiene **7,5ml** a una concentración de 60mg/ml.



Durante su **almacenamiento**, los viales deben mantenerse en su embalaje original a una temperatura de **2-8°C**.
No congelar.



Escanea este QR para acceder a la ficha técnica de espesolimab.

Guía de preparación y de administración de Spevigo® (espesolimab) para los brotes de psoriasis pustulosa generalizada (PPG)



 **Spevigo®**
espesolimab

SPE1246.102024

 **Boehringer
Ingelheim**

Spevigo 450 mg concentrado para solución para perfusión, 2 viales de 7,5 ml, PVP IVA: 20.130,15€. Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de uso hospitalario.

(▽) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas adversas asociadas a este medicamento.

Instrucciones para la preparación de Spevigo® antes de la administración al paciente¹:

 La preparación de la medicación debe hacerse en condiciones asépticas. Para más información, consultar ficha técnica¹.

1 Preparación del material



Bolsa para perfusión de 100ml de capacidad con: Cloruro sódico 0,9% o vacía



Inspeccionar visualmente el vial antes de su uso. Si la solución está turbia, ha cambiado de color o contiene partículas grandes o de color, desechar el vial.

2a Preparación de la medicación: dilución en bolsa de perfusión con 100ml de solución salina 0,9%



Medicación lista para ser administrada al paciente con la mayor brevedad posible.

 Una vez preparada la medicación, es estable durante 24h a una temperatura de 2-30°C. No congelar. Conservar fuera de la luz en condiciones asépticas.

2b Preparación de la medicación: dilución en bolsa de perfusión vacía



Medicación lista para ser administrada al paciente con la mayor brevedad posible.



Una vez preparada la medicación, es estable durante 24h a una temperatura de 2-30°C. No congelar. Conservar fuera de la luz en condiciones asépticas.

3 Administración de la medicación

Esta medicación:



Se administra en forma de **perfusión intravenosa continua** y es solo para perfusión intravenosa¹



A través de una vía intravenosa que contiene un **filtro en línea estéril, apirógeno y de baja unión a proteínas** (0,2 µm de tamaño de poro)¹



No se debe administrar en forma de **inyección intravenosa rápida** (en bolo)¹



- No se debe administrar ninguna otra perfusión en paralelo a través del mismo acceso intravenoso¹.
- En caso de que la perfusión se ralentice o se interrumpa temporalmente, el tiempo total de perfusión (incluido el tiempo de parada) no debe ser superior a 180 minutos¹.

PPG: psoriasis pustulosa generalizada

1. Ficha técnica: Spevigo®. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1221688001/FT_1221688001.html.